

SEÑALES DE ADVERTENCIA DESPUES DE VISITA INICIAL PRUEBA DE EMBARAZO

RECOMENDACIONES: Se recomienda que vea a un médico para cualquiera de los siguientes síntomas que podrían indicar una ETS:

- ✚ Dolor o picazón anal (agujero anal duele o pica)
- ✚ Picazón en el área púbica (area privada), más de 2 semanas
- ✚ Los piojos o los huevos vistos en en su área púbica (area privada)
- ✚ Adolorido o golpe en los genitales (area privada) en los ultimos 12 meses.
- ✚ Sarpullido generalizado en el cuerpo de los dos lados, en los últimos 12 meses
- ✚ Female with abnormal vaginal discharge (odd smell or color), > 5 days
- ✚ Mujer con flujo vaginal anormal (olor extraño o color), > 5 días
- ✚ Mujer con sangrado después de sexo
- ✚ Mujer con dolor abdominal inferior diaria, no durante el período
- ✚ Hombre con secreción del pene o ardor durante la micción
- ✚ Varón con dolor testicular severo

SI NO COMIENZA SU PERIODO, TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES SEÑALES DE ADVERTENCIA DE EMBARAZO

Llame a su médico o ir a un local atención urgente o ER para lo siguiente:

1. Sangrado Vaginal: Algo de manchado es normal, pero el sangrado puede ser un signo de embarazo aborto involuntario o embarazo ectópico. Sangrado fuerte, calambres o dolor abdominal no es la norma, y puede ser señal de un aborto involuntario o un embarazo ectópico
2. Exceso de Náuseas y Vómitos: es incapaz de mantener alimentos o líquidos.
3. Alta Fiebre: Una fiebre superior a 101 grados durante el embarazo puede ser grave
4. El dolor y Ardor al orinar: estos pueden ser signos de infecciones de la vejiga o del tracto urinario, que necesitan atención pronto.